



FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: 1920
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



Altivo[®]

EXTRA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Fenhexamid: 300 g/L

Fludioxonil: 125 g/L

Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 Litro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALTIVO EXTRA 425 SC es un fungicida de contacto con acción translaminar, lo cual le da protección preventiva y curativa. La mezcla de sus dos ingredientes activos Fludioxonil (Contacto) y Fenhexamid (Translaminar) que actúan de forma diferente, hacen de **ALTIVO EXTRA 425 SC** una herramienta ideal para el manejo de la Botrytis, ya que se disminuye la probabilidad de desarrollo de resistencia.

ALTIVO EXTRA 425 SC ataca al hongo en 4 momentos diferentes de su desarrollo biológico: inhibe la germinación de las esporas, el crecimiento del tubo germinativo, la penetración dentro de la planta y el crecimiento interno (inter e intracelular) del micelio.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS*	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
BANANO (<i>Musa sp.</i>)	<i>Sigatoka Negra</i> (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.0 L/Ha	0	4
ROSA (<i>Rosa sp.</i>)	<i>Botrytis - Moho gris</i> (<i>Botrytis cinérea</i>)	1.35 L/Ha	2	
CRISANTEMO (<i>Chrysanthemum sp.</i>)		1.0 L/Ha		
FRESA (<i>Fragaria sp.</i>)	<i>Botrytis</i> (<i>Botrytis cinérea</i>)	0.9 L/Ha	N.A.	12
ARÁNDANO ALTO (<i>Vaccinium corymbosum</i>)				
ARÁNDANO OJO DE CONEJO (<i>Vaccinium ashei</i>)				
ARÁNDANO CRANBERRY (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)				
FRAMBUESA (<i>Rubus idaeus</i>)				
MORA (<i>Rubus sp.</i>)				
UVA (<i>Vitis sp.</i>)				
BREVO (<i>Higuera ficus carica</i>)				

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.
N.A.: No aplica

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: 1920
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

Altivo[®]

EXTRA



FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación con los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones como temperaturas y humedad sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

MODO DE APLICACIÓN

Para la preparación de la mezcla se recomienda llenar con agua el tanque del equipo a utilizar con la mitad del volumen, luego colocar el agitador en marcha y agregar la dosis requerida de **ALTIVO EXTRA 425 SC** hasta obtener una mezcla homogénea y estable, finalmente completar con agua hasta el volumen deseado.

COMPATIBILIDAD



ALTIVO EXTRA 425 SC es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, si es utilizado bajo las recomendaciones de la etiqueta, sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.



FITOTOXICIDAD

ALTIVO EXTRA 425 SC es bien tolerado por los cultivos mencionados siempre y cuando se aplique acorde con las recomendaciones de uso.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

Los residuos del producto **ALTIVO EXTRA 425 SC** no afectan los cultivos siguientes dentro de una rotación, si se siguen las recomendaciones y se aplican las dosis de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

La ingestión genera disminución de la capacidad respiratoria, fatiga, contracción de los músculos y calambres.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Contacto con la piel y la ropa: Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos contaminados con abundante agua durante 10 a 15 minutos.
- En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.
- NO PROVOCAR VOMITO, si el paciente está consciente administre una taza de agua. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNIQUESE
CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012
(fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono
(091) 2886012. Atención 24 horas.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO

No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general.

PRESENTACIONES

1L

