



FUNGICIDA AGRÍCOLA
EMULSION CONCENTRADA (EC)
Registro Nacional ICA No. 1229
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

ESTRUENDO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Miclobutanil:.....240 g/L

Ingredientes aditivos:.....c.s.p 1 Litro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESTRUENDO EC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Es absorbido rápidamente por la planta, protegiendo los brotes nuevos. Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol lo que provoca la muerte del hongo hasta 4 días después de haberse iniciado la infección.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
ARROZ	Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>)	140 cc/Ha*	7 días	12 horas
	Helminthosporium (<i>Helminthosporium oryzae</i>)			
ROSA	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0.25 cc/L**	N/A	
CEBOLLA	Alternaria – Punteo (<i>Alternaria porri</i>)	250 cc/Ha	7 días	
TOMATE	Alternaria – Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	400 cc/Ha	1 día	

P.C.: Período de carencia. n/a: No Aplica.

P.R.: Período de reingreso

* Dosis/ha promedio, se usaran las dosis de ESTRUENDO para un volumen de aplicación de 200 L/ha aproximado para arroz, realizando una previa calibración del equipo de fumigación.

**Dosis/100L de agua, se usaran las dosis de ESTRUENDO para un volumen de aplicación de 1000 L/ha aproximado para rosa, realizando una previa calibración del equipo de fumigación.

FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

ESTRUENDO EC se utiliza dependiendo de las condiciones ambientales y de la aparición de las enfermedades.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

En diferentes estudios de campo, se ha demostrado que los residuos presentes en el suelo no interfieren en el desarrollo de los cultivos posteriores.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



FUNGICIDA AGRÍCOLA
EMULSION CONCENTRADA (EC)
Registro Nacional ICA No. 1229
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

ESTRUENDO

COMPATIBILIDAD

ESTRUENDO EC es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas de uso común. No se debe mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina. En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer pruebas de Fito compatibilidad.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNIQUESE CON CISPROQUIM:**
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono (091) 2886012.
Atención 24 horas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

PRESENTACIONES

1L

FITOTOXICIDAD

ESTRUENDO EC es totalmente selectivo a los cultivos recomendados, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso de esta etiqueta.



ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA
CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA
GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES
VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA
SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO
INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO
Y ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS
APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.**

