



FUNGICIDA AGRÍCOLA  
POLVO MOJABLE (WP)  
REGISTRO NACIONAL ICA No. 356  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# MOXAN<sup>®</sup> MZWP

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO

Cymoxanil: ..... 80 gr/kg.

Mancozeb: ..... 640 gr/kg.

Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 Kg

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**MOXAN MZ WP**, es un fungicida formulado como una mezcla de dos ingredientes activos diferentes: una parte protectante como es el “MANCOZEB” y otra sistémica curativa como es el “CYMOXANIL”. Esto le confiere un doble modo de acción: protectante o preventivo y sistémico curativo, siendo más eficiente en el manejo de las enfermedades.

**MOXAN MZ WP**, posee una acción preventiva y de post-infección, cuando el hongo está en incubación. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto, especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad.

### TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS*	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
PAPA	Gota ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2 kg/Ha	12 días	12
ORNAMENTALES (Rosa, Clavel, Pompón)	Mildeo vellosa ( <i>Peronospora sparsa</i> )	3 kg/Ha (2.5 g/l)	N.A.	
P.C. (Periodo de carencia): Días entre la última aplicación y la cosecha. P.R. (Periodo de reentrada): horas para ingresar al área tratada sin equipo de protección personal.				



### FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

La dosis y frecuencia de aplicación dependen del clima, del grado de infestación de la enfermedad y del estado de desarrollo del cultivo. Se aplica a campo abierto, evitando aplicar con lluvias y vientos fuertes.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Disuelva completamente la cantidad de **MOXAN MZ WP** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de la mezcla, el cual debe contener agua hasta  $\frac{3}{4}$  o la mitad de su capacidad. Complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

### EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

**MOXAN MZ WP** se puede aplicar con los equipos convencionales, los tanques se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Asegúrese que la aplicación se realice uniformemente. Verifique la calibración de los equipos y recuerde que ésta se hace más crítica al disminuir el volumen empleado por hectárea. Su forma de empleo es en aspersión foliar.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



FUNGICIDA AGRÍCOLA  
POLVO MOJABLE (WP)  
REGISTRO NACIONAL ICA No. 356  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# MOXAN® MZWP

## COMPATIBILIDAD



**MOXAN MZ XP** no es compatible con productos fuertemente alcalinos.

## PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.
- Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos. En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.
- Si el producto se ha ingerido, enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito.

## PRESENTACIONES

500 gr



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,  
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:  
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)  
o en Bogotá al teléfono (091) 2886012.  
Atención 24 horas.**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE  
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

## FITOTOXICIDAD

**MOXAN MZ WP** ha mostrado seguridad ya que no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo, si se siguen las indicaciones y la dosis recomendada.

## GUÍA PARA EL MÉDICO

- Síntomas de intoxicación: La ingestión genera diarrea, náusea y vómito. La inhalación genera dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar y tos. El contacto con la piel y los ojos genera enrojecimiento, dermatitis y dolor. Otros: Nerviosismo, vértigo, visión borrosa, calambres y molestia en el pecho.
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.
- Contraindicaciones: Alcohol.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

**ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO  
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR  
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”  
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y  
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”  
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES  
VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA  
SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO  
INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y  
ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS  
POR LA AUTORIDAD LOCAL.**

