



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)  
No. Registro Nacional ICA: 1705  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



# PROXAM 200 EC

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### INGREDIENTE ACTIVO

Acetamiprid: ..... 100 g/L    Ingredientes aditivos: ..... c.s.p. 1 Litro  
Pyriproxifen: ..... 100 g/L

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**PROXAM 200 EC** es un insecticida que combina 2 ingredientes activos de acción complementaria: Acetamiprid, tiene alta acción sistémica y actividad translaminar, actúa por contacto e ingestión con un amplio espectro perteneciente al grupo químico Neonicotinoide y Pyriproxifen, es un ingrediente activo translaminar, que actúa por contacto e ingestión perteneciente al grupo químico de las Piridinas.

Estos 2 ingredientes le dan al **PROXAM 200 EC** un amplio espectro de protección contra Homópteros, Thysanópteros y Lepidópteros. Excelente eficacia, por sus dos modos de acción, contacto e ingestión, presenta efecto prolongado de protección gracias a su actividad translaminar.

### TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
AGUACATE	Escama articulada ( <i>Selenaspidus articulatus</i> )	0,4 L/Ha	14	4
CRISANTEMO	Minador ( <i>Liriomyza trifolii</i> )	0,75 cc/L	N.A	4
CLAVEL	Thrips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	0.7 cc/L	N.A	4
ARROZ	Chinche ( <i>Oebalus insularis</i> )	0.300 L/Ha	30	12
LIMÓN	Escama articulada ( <i>Selenaspidus articulatus</i> )	0.300 – 0.500 L/Ha	14	12
	Psilido de los citricos ( <i>Diaphorina citri</i> )			
TOMATE	Mosca blanca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	0.500 L/Ha	7	4
	Caracha / Prodiplosis ( <i>Prodiplosis longifilia</i> )	0.600 L/Ha		

P.C. Periodo de carencia: Tiempo entre la última aplicación y la cosecha.  
P.R. Periodo de reingreso: Periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la reentrada del personal al área aplicada (ver tiempo en cuadro).

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)  
No. Registro Nacional ICA: 1705  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



**anasac**  
COLOMBIA

# PROXAM 200 EC



## FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

**PROXAM 200 EC** debe ser aplicado con la dosis recomendada al momento en se observen los primeros individuos de la plaga a controlar.

Para la preparación de la mezcla se recomienda llenar con agua el tanque del equipo a utilizar con la mitad del volumen, luego colocar el agitador en marcha y agregar la dosis requerida de **PROXAM 200 EC** hasta obtener una mezcla homogénea y estable, finalmente completar con agua hasta el volumen deseado.

## MODO DE APLICACIÓN

Para la preparación de la mezcla se recomienda llenar con agua el tanque del equipo a utilizar con la mitad del volumen, luego colocar el agitador en marcha y agregar la dosis requerida de **PROXAM 200 EC** hasta obtener una mezcla homogénea y estable, finalmente completar con agua hasta el volumen deseado.

## COMPATIBILIDAD



**PROXAM 200 EC** es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, si es utilizado bajo las recomendaciones de la etiqueta, sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

## EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

Los residuos del producto **PROXAM 200 EC** no afectan los cultivos siguientes dentro de una rotación, si se siguen las recomendaciones y se aplican las dosis de la etiqueta.

## FITOTOXICIDAD

**PROXAM 200 EC** es bien tolerado por los cultivos mencionados siempre y cuando se aplique acorde con las recomendaciones de uso.



## EQUIPOS DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACIÓN

**PROXAM 200 EC** Se puede aplicar con los equipos convencionales que existen regularmente en las fincas. Recuerde utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurar que la aplicación se realice uniformemente. Verificar la calibración de los equipos y recordar que esta se hace más crítica al disminuir el volumen de aguas empleado por hectáreas. Se aplica por aspersión foliar. Los equipos y los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,  
COMUNÍQUESE  
CON CISPROQUIM:  
Línea 01 8000 916012  
(fuera de Bogotá)  
o en Bogotá al teléfono  
(091) 2886012. Atención 24 horas.**

**ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO  
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR  
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"  
"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y  
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"  
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES  
LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN  
LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O  
PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE  
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA  
AUTORIDAD LOCAL.**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



INSECTICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)  
No. Registro Nacional ICA: 1705  
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



**anasac**  
COLOMBIA

# PROXAM 200 EC

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- No almacene ni transporte junto con alimentos, bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

## INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE  
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

## PRESENTACIONES

200cc - 1L

